

2026 - 2027 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Childcare and Pre-K Facilities

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This chart is not intended as a substitute for consulting the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements for childcare facilities by the Human Resources Code, Chapter 42.

A child shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a childcare facility in Texas.

Age at which child must have vaccines to be in compliance:	Minimum Number of Doses Required of Each Vaccine							
	Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTaP)	Polio	Hepatitis B (HepB) ¹	<i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib) ²	Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) ³	Measles, Mumps and Rubella (MMR) ^{1, 4}	Varicella ^{1, 4, 5}	Hepatitis A (HepA) ^{1, 4}
Zero through two months								
By three months	One dose	One dose	One dose	One dose	One dose			
By five months	Two doses	Two doses	Two doses	Two doses	Two doses			
By seven months	Three doses	Two doses	Two doses	Two doses	Three doses			
By 16 months	Three doses	Two doses	Two doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	
By 19 months	Four doses	Three doses	Three doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	
By 25 months	Four doses	Three doses	Three doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	One dose
By 43 months	Four doses	Three doses	Three doses	Three doses	Four doses	One dose	One dose	Two doses

¹ Serologic evidence of infection or serologic confirmation of immunity to measles, mumps, rubella, hepatitis B, hepatitis A, or varicella is acceptable in place of vaccine.

² A complete Hib series is two doses plus a booster dose on or after 12 months of age (three doses total). If a child receives the first dose of Hib vaccine at 12 - 14 months of age, only one additional dose is required (two doses total). Any child who has received a single dose of Hib vaccine on or after 15 - 59 months of age is in compliance with these specified vaccine requirements. Children 60 months of age and older are not required to receive Hib vaccine.

³ If the PCV series is started when a child is seven months of age or older, or the child is delinquent in the series, then all four doses may not be required. Please reference the information below to assist with compliance:

- For children seven through 11 months of age, two doses are required.
- For children 12 - 23 months of age: if three doses have been received prior to 12 months of age, then an additional dose is required (total of four doses) on or after 12 months of age. If one or two doses were received prior to 12 months of age, then a total of three doses are required with at least one dose on or after 12 months of age. If zero doses have been received, then two doses are required with both doses on or after 12 months of age.

- Children 24 months - 59 months of age: meet the requirement if they have at least three doses with one dose on or after 12 months of age, or two doses with both doses on or after 12 months of age, or one dose on or after 24 months of age. Otherwise, an additional dose is required. Children 60 months of age and older are not required to receive PCV vaccine.

⁴ For MMR, Varicella, and Hepatitis A vaccines, the first dose must be given on or after the first birthday. Vaccine doses administered within four days before the first birthday will satisfy this requirement.

⁵ Previous illness may be documented with a written statement from a physician, school nurse, or the child's parent or guardian containing wording such as: "This is to verify that (name of child) had varicella disease (chickenpox) on or about (date) and does not need varicella vaccine." The written statement will be acceptable in place of any and all varicella vaccine doses required.

Requisitos mínimos de vacunación en Texas de 2026 a 2027 para centros de cuidado infantil y prekinder

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados a las secciones 97.61 a 97.72, título 25, Servicios de salud, del Código Administrativo de Texas (TAC). No tiene como propósito sustituir las consultas al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El capítulo 42 del Código de Recursos Humanos, concede al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad de establecer requisitos de vacunación a los centros de cuidado infantil.

Los menores deben presentar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a un centro de cuidado infantil en Texas.

Edad a la que el niño debe recibir las vacunas para cumplir con los requisitos:	Cantidad mínima de dosis requeridas por cada vacuna							
	Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP)	Polio	Hepatitis B (HepB) ¹	<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib) ²	Vacuna antineumocócica conjugada (PCV) ³	Sarampión, paperas y rubéola (MMR) ^{1,4}	Varicela ^{1,4,5}	Hepatitis A (HepA) ^{1,4}
De 0 a 2 meses								
Antes de los 3 meses	Una dosis	Una dosis	Una dosis	Una dosis	Una dosis			
Antes de los 5 meses	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis			
Antes de los 7 meses	Tres dosis	Dos dosis	Dos dosis	Dos dosis	Tres dosis			
Antes de los 16 meses	Tres dosis	Dos dosis	Dos dosis	Tres dosis	Cuatro dosis	Una dosis	Una dosis	
Antes de los 19 meses	Cuatro dosis	Tres dosis	Tres dosis	Tres dosis	Cuatro dosis	Una dosis	Una dosis	
Antes de los 25 meses	Cuatro dosis	Tres dosis	Tres dosis	Tres dosis	Cuatro dosis	Una dosis	Una dosis	Una dosis
Antes de los 43 meses	Cuatro dosis	Tres dosis	Tres dosis	Tres dosis	Cuatro dosis	Una dosis	Una dosis	Dos dosis

¹ En lugar de la vacuna, es aceptable una prueba serológica de infección o la confirmación serológica de inmunidad al sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis B, la hepatitis A o la varicela.

² Una serie completa de la vacuna Hib consta de dos dosis más una dosis de refuerzo alrededor de los 12 meses de edad (tres dosis en total). Si un menor recibe la primera dosis de la vacuna Hib entre los 12 y los 14 meses de edad, solo se requiere que se le aplique una dosis adicional (dos dosis en total). Los menores que reciben una dosis única de la vacuna Hib entre los 15 y los 59 meses de edad o en adelante cumplen con estos requisitos específicos de vacunación. No es requerido que los niños de 60 meses en adelante reciban la vacuna Hib.

³ Si un niño empieza a recibir la serie de la vacuna PCV después de los 7 meses, o si no se aplica la serie completa, es posible que no se le requiera que se aplique las cuatro dosis. Reférase a la siguiente información para estar en cumplimiento con los requisitos:

- Niños de 7 a 11 meses, se requiere que se apliquen dos dosis.
- Niños de 12 a 23 meses: Si recibieron tres dosis antes de los 12 meses de edad, se requiere una dosis adicional (un total de cuatro dosis) a los 12 meses de edad o después. Si recibieron una o dos dosis antes de los 12 meses de edad, se requiere un total de tres dosis con al menos una dosis a los 12 meses de edad o después. Si no han recibido ninguna dosis, se requieren dos dosis, ambas a los 12 meses de edad o después.
- Niños de 24 a 59 meses: cumplen con el requisito si se han aplicado al menos tres dosis, una de las cuales la recibieron a los 12 meses de edad o después; o dos dosis, ambas recibidas a los 12 meses de edad o después; o una dosis recibida a los 24 meses de edad o después. De lo contrario, es necesaria una dosis adicional. No se requiere que los niños de 60 años en adelante se apliquen la vacuna PCV.

⁴ En el caso de las vacunas MMR y contra la varicela y la hepatitis A, se debe aplicar la primera dosis alrededor del primer cumpleaños. Para satisfacer este requisito, es suficiente que la aplicación de la vacuna se haga hasta cuatro días antes del primer cumpleaños.

⁵ Si se ha tenido la enfermedad previamente, puede documentarse con una declaración escrita de un médico, un enfermero escolar, uno de los padres o el tutor del menor, la cual diga algo como: “Esto es para comprobar que (nombre del menor) tuvo varicela el (fecha) o alrededor de esa fecha y no necesita la vacuna contra la varicela”. Dicha declaración escrita será aceptable en lugar de alguna o todas las dosis requeridas de la vacuna contra la varicela.